

Farne

Botrychium matricariifolium

- BENNERT, H.W. (1999): Die seltenen u. gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands. – Biologie, Verbreitung, Schutz. Bonn-Bad Godesberg (Landwirtschaftsverlag), 381 S.
- „BOTANIK IM BILD“ / Bild-Datenbank der Wildpflanzen Österreichs:
<http://flora.nhm-wien.ac.at/Seiten-Arten/Botrychium-matricariifolium.htm>
- FLORAWEB:
<http://www.floraweb.de/pflanzenarten/druck.xsql?suchnr=857&sipnr=857&>
- HEGI, G. (1984): Illustrierte Flora von Mitteleuropa; Band I, Teil 1, S. 90-93; Verlag Paul Parey Berlin/Hamburg
- HORN, K., STROBEL, C. & BENNERT, H.W., (2001): Die Bestandessituation gefährdeter Farnpflanzen (Pteridophyta) in Bayern – erster Bericht über Planung u. Durchführung von Schutz- u. Pflegemaßnahmen. – Schriftenreihe Bayer. Landesamt Umweltschutz 156 (Beitr. Artenschutz 23): 139-174.

- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW:
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o8&id=1519>
- OBERNDORFER, E. (1990): Pflanzen-soziologische Exkursionsflora: S. 71; Verlag Eugen Ulmer
- ROTHMALER, W. (2002): Exkursionsflora von Deutschland, Band 4, Gefäßpflanzen: Kritischer Band: S. 120, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg – Berlin
- WISSKIRCHEN, R., HAEUPLER, H. (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, Band 1: S. 102, Verlag Eugen Ulmer
- ZÜNDORF, H.-J., GÜNTHER, K.-F., KORSCH, H. & WESTHUS, W. (2006): Flora von Thüringen: S. 42; Weissdorn-Verlag Jena

Farne

Trichomanes speciosum

- BENNERT, H. W., JÄGER, W., LEONHARDS, W., RASBACH, H. & RASBACH, K. (1994): Prothallien des Hautfarns *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) auch in Nordrhein-Westfalen. – Floristische Rundbriefe 28 (1): 80.
- BENNERT, H. W. (1999): Die seltenen und gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands. Biologie, Verbreitung, Schutz. Bundesamt für Naturschutz, S. 192-200. Bonn-Bad Godesberg
- BUJNOCH, W. & KOTTKE, U. (1994): Der Gametophyt von *Trichomanes speciosum* WILLD. Im Regierungsbezirk Trier. – Dendrocopos 21: S. 225-230. Trier.
- FLORAWEB:
<http://www.floraweb.de/pflanzenarten/druck.xsql?suchnr=7415&sipnr=7415&>
- HAUKE, U. (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose, Kapitel 1 Farn- und Blütenpflanzen, Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz.

- Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.1: S. 190-194. Bonn-Bad Godesberg
- HEGI, G. (1984): Illustrierte Flora von Mitteleuropa; Band I, Teil 1, S. 121; Verlag Paul Parey Berlin / Hamburg
- HORN, K. (1998): Gametophyten des Hautfarns *Trichomanes speciosum* WILLD.. (Hymenophyllaceae, Pteridophyta) im südlichen Niedersachsen und angrenzenden Landesteilen von Hessen und Thüringen. – Braunschweiger naturkundliche Schriften 5: S. 705728.
- HORN, K. (2002): Untersuchungen zur Bestandessituation des Prächtigen Hautfarns (*Trichomanes speciosum* WILLD.) in Thüringen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie). – Unveröff. Gutachten im Auftrag der Thüringer Landesanstalt für Umwelt (TLU).
- HUCK, S. (1997): *Trichomanietum speciosi* ass.nov. ein Farn-Prothallium als Charakterart einer Moosgesellschaft. – Tuxenia. N.S. 17: 337-340.
- HUCK, S. & MICHEL, T. (2002): Artensteckbrief

- Prächtiger Dünnpfarn (*Trichomanes speciosum*), Entwurf 2003; Auftrag des RP Kassel; Link:
http://interweb1.hmulv.hessen.de/imperia/md/content/internet/pdfs/naturschutzundforsten/fortsetzungnatura2000/trichomanes_speciosum_steckbrief_2002.pdf
- KIRSCH, H. & BENNERT, H. W., (1996): Erstnachweis von Gametophyten des Hautfarns *Trichomanes speciosum* WILLD. (Hymenophyllaceae) in Bayern. – Nachr. Naturwiss. Mus. Aschaffenburg 103: S. 119-133. Aschaffenburg.
- KOTTKE, U. (1999): Neue Gametophytenstandorte von *Trichomanes speciosum* WILLD. (Hymenophyllaceae) im Regierungsbezirk Trier und die Bedeutung der vegetativen Vermehrung für die Verbreitung der Art. – Dendrocopos 26: S. 365-386.
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW:
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o8&id=4222>
- OBERNDORFER, E. (1990): Pflanzensoziologische Exkursionsflora: S. 71-72; Verlag Eugen Ulmer
- RASBACH, H., RASBACH, K. & JEROME, C. (1993): Über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) in den Vogesen (Frankreich) und dem benachbarten Deutschland. – Carolea 51: S. 51-52.
- RASBACH, H., RASBACH, K. & JEROME, C. (1995): Weitere Beobachtungen über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* WILLD. in den Vogesen und dem benachbarten Deutschland. – Carolea 53: S. 21-32. Karlsruhe.
- RASBACH, H., RASBACH, K., JEROME, C. & SCHROPP, G. (1999): Die Verbreitung von *Trichomanes speciosum* WILLD. (Pteridophyta) in Südwestdeutschland und den Vogesen. – Carolea 57: S. 27-42. Karlsruhe.
- ROTHMALER, W. (2002): Exkursionsflora von Deutschland, Band 4, Gefäßpflanzen: Kritischer Band: S. 120, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg – Berlin
- STARK, C. (2002): *Trichomanes speciosum* WILLD. (Hymenophyllaceae, Pteridophyta), ein tropischer Hautfarn als neue Pflanzenart für den Pfälzerwald und die Sickinger Höhe. – Mitt. Pollichia 89: S. 197-249.
- VOGEL, J.C., JESSEN, S., GIBBY, M., JERMY, A.C. & ELLIS, L. (1993): Gametophytes of *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae: Pteridophyta) in Central Europe. – Fern Gaz. 14 (6): S. 227-232.
- WISSKIRCHEN, R., HAEUPLER, H. (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, Band 1: S. 526, Verlag Eugen Ulmer
- ZÜNDORF, H.-J., GÜNTHER, K.-F., KORSCH, H. & WESTHUS, W. (2006): Flora von Thüringen: S. 43; Weissdorn-Verlag Jena