

Käfer***Aesalus scarabaeoides***

- BRECHTEL, F. & H. KOSTENBADER (2002): Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- CONRAD, R. (1992): Zur Verbreitung und Gefährdung der Hirschkäferarten (Coleoptera, Lucanidae) Thüringens. - Naturschutzreport, **4**: S. 123-132.
- CONRAD, R. (1995): Checklist der Hirschkäfer (Coleoptera: Lucanidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten, Teil **3**: S. 53-53.
- HARTMANN, M., KOPETZ, A. & A. WEIGEL (2000): Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 1998 bis 1999 und Wiederfunde verschollener Käferarten seit dem „Erscheinen des Verzeichnisses der Käfer Deutschlands“ (Insecta, Coleoptera). - Thür. Faun. Abh. **VII**: S. 229-245.
- HORION, A. (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer (Lamelliocornia), **VI**, Überlingen.
- HURKA, K. (2005): Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Brouci Ceske a Slovenske republiky. - Nakladatelstvi Kabourek Zlin.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomofauna Germanica. Ent. Nachr. Ber. (Dresden), Beiheft **4**: S. 1-185.
- KOPETZ, A. & A. WEIGEL (2003): Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2000 bis 2003 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera). - Thür. Faun. Abh. **IX**: S. 149-168.
- MOHR, K.-H. (1963): Die Käferfauna des Kyffhäuser-Südabfalls. - Wiss. Z. Uni Halle Mat-N.R.N.F., **7** (12): S. 513-565.
- RÖSSNER, E. (1991): Zur Fauna der Scarabaeoidea (Coleoptera) des Kyffhäusergebirges. - Ent. Nachr. Ber. **35**: S. 122-124.
- RÖSSNER, E. (1999): Aktuelle Nachweise neuer, verschollener oder gefährdeter Arten der Blatthornkäfer und Hirschkäfer (Col.: Scarabaeoidea) in Thüringen. - Thür. Faun. Abh. **VI**: S. 191-200.
- RÖSSNER, E. (2002): Der Kurzschröter *Aesalus scarabaeoides* (Panzer, 1794) in Thüringen (Coleoptera: Scarabaeoidea: Lucanidae). - Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha **22**: S. 97-100.
- TEV - THÜRINGER ENTOMOLOGEN VERBAND (2007): Datenbank J. Weipert, Stand 30.11.2007.
- ZAHRADNIK, J. (1985): Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde. - Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.

Käfer***Cylindera areanaria viennensis***

- GEBERT, J. (1991): Über die Verbreitung und Biologie von *Cylindera (Eugrapha) areanaria* (FUESSILIN, 1775) in der Mark Brandenburg und Sachsen (Col., Cicindelidae). - Ent. Nachr. Ber. **35** (4): S. 275-276.
- GEBERT, J. (1996): Feldbeobachtungen zur Biologie von *C. areanaria viennensis* SCHRANK. - Ent. Nachr. Ber. **40** (2): S. 136-137.
- HARTMANN, M. (1999): Checkliste der Laufkäfer Thüringens (Carabidae). - Check-Listen Thüringer Insekten **7**: S. 31-42.
- HURKA, K. (2005): Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Brouci Ceske a Slovenske republiky. - Nakladatelstvi Kabourek Zlin.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomofauna Germanica. Ent. Nachr. Ber. (Dresden), Beiheft **4**: S. 1-185.
- LÖBL, I. & A. SMETANA (2003): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata - Myxophaga - Adephaga. Apollo Books Stenstrup.
- MARGGI, W. A. (1992): Faunistik der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Schweiz (Cicindaelidae & Carabidae) Coleoptera. Teil 1 / Text. - Documenta Faunistica Helvetiae, **13**: S. 1-477.

- MÜLLER-KROEHLING, ST., GRÜNWALD, M. & E. SCHEUCHL (2000): Wiederfund von *Cicindela arenaria viennensis* (Schränk, 1781) in Bayern und Umsiedlungsversuch aus dem bedrohten Lebensraum. - Angewandte Carabidologie **2/3**: S. 81-89.
- PESCHEL, R. (1981): Ein neuer Fund *Cicindela arenaria* FUESSILY, 1775 in der DDR (Col., Cicindelidae). - Ent. Nachr. **25** (7-8): S. 124-124.
- RICHTER, F. (1986): Weitere Funde von *Cicindela arenaria* FUESSILY, 1775 in der Niederlausitz (Col., Cicindelidae). - Ent. Nachr. Ber. **30** (4): S. 181-181.
- TRAUTNER, J. (1996): Historische und aktuelle Bestandssituation des Sandlaufkäfers *Cicindela arenaria* Fuessilin, 1775 in Deutschland (Col., Cicindelidae). - Ent. Nachr. Ber. **40** (2): S. 83-88.
- UNRUH, M. (1994): Ein syntopes Vorkommen von *Cicindela arenaria* (FUESSILIN, 1775) und *Cicindela germanica* LINNE, 1759 in einem Tagebaurestloch im südlichen Sachsen-Anhalt (Col., Cicindelidae). - Ent. Nachr. Ber. **38** (4): S. 275-276.
- WACHMANN, E., PLATEN, R. & D. BARNDT (1995): Laufkäfer. Beobachtung - Lebensweise. - Naturbuch Verlag Augsburg.

Käfer

Cylindera germanica

- FRITZE, M.-A., KROUPA, A. & W. LORENZ (2004): Der Deutsche Sandlaufkäfer *Cylindera germanica* (Linnaeus, 1758) im Landkreis Lichtenfels (Oberfranken / Bayern). - Angewandte Carabidologie **6**: S. 7-14.
- HARTMANN, M. (1999): Checkliste der Laufkäfer Thüringens (Carabidae). - Check-Listen Thüringer Insekten **7**: S. 31-42.
- HURKA, K. (2005): Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Brouci Ceske a Slovenske republiky. - Nakladatelství Kabourek Zlín.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomofauna Germanica. Ent. Nachr. Ber. (Dresden), Beiheft **4**: S. 1-185.
- LÖBL, I. & A. SMETANA (2003): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata - Myxophaga - Adephaga. Apollo Books Stenstrup.
- MARGGI, W. A. (1992): Faunistik der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Schweiz (Cicindelidae & Carabidae) Coleoptera. Teil 1 / Text. - Documenta Faunistica Helvetiae **13**: S. 1-477.
- SKALE, A. & A. WEIGEL (2001): Zur Käferfauna (Insecta: Coleoptera) der „Schlechtsarter Schweiz“ in Südthüringen (Landkreis Hildburghausen. - Thür. Faun. Abh. **VIII**: S. 103-125.
- TEV - THÜRINGER ENTOMOLOGEN VERBAND (2007): Datenbank J. Weipert, Stand 30.11.2007.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2007): LINFOS-Datenbankauszug, Stand 30.11.2007.
- TURIN, H. (2000): De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). - Nederlandse Fauna 3. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden.
- UNRUH, M. (1994): Ein syntopes Vorkommen von *Cicindela arenaria* (FUESSILIN, 1775) und *Cicindela germanica* LINNE, 1759 in einem Tagebaurestloch im südlichen Sachsen-Anhalt (Col., Cicindelidae). - Ent. Nachr. Ber. **38** (4): S. 275-276.
- WACHMANN, E., PLATEN, R. & D. BARNDT (1995): Laufkäfer. Beobachtung - Lebensweise. - Naturbuch Verlag Augsburg.

Käfer

Dytiscus latissimus

- HENDRICH, L. & M. BALKE (2001): Breitrand (*Dytiscus latissimus*) und Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (*Graphoderus bilineatus*). - In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H. SALM, P. & E. SCHRÖDER: Berichtspflichten in NATURA-2000 Gebieten - Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhang II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie. Angewandte Landschaftsökologie **42**: S. 301-305. Bonn-Bad Godesberg.
- HENDRICH, L. & M. BALKE (2003): *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758. - In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G.,

- BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHROEDER, E. & SSYMAN, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft **69**, Bd.1: S. 378-387. Bonn-Bad Godesberg.
- HENDRICH, L. & D. SPITZENBERG (2006): *Dystiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 In: SCHNITZER, P., EICHEN, C., ELLWANGER, G., NEUKIRCHEN, M. & E. SCHRÖDER (Bearb.) (2006): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: S. 147-148.
- HURKA, K. (2005): Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Brouci Ceske a Slovenske republiky. - Nakladatelstvi Kabourek Zlin.
- KLAUSNITZER, B. (1984): Käfer in und am Wasser. - Die Neue Brehm-Bücherei. A. Ziemsen Verlag, Lutherstadt Wittenberg: S. 1-148.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomofauna Germanica. Ent. Nachr. Ber. (Dresden), Beiheft **4**: S. 1-185.
- SCHMIDT, G., MEITZNER, V. & M. GRÜNWALD (2006): Erster Nachweis von *Dystiscus latissimus* (LINNAEUS, 1758) in Mecklenburg-Vorpommern (Coleoptera, Dyscidae) seit 1967. - Ent. Nachr. Ber. **50** (4): S. 239-240.
- TEV (THÜRINGER ENTOMOLOGEN VERBAND) (2007): Datenbank J. Weipert, Stand 30.11.2007.
- ZAHRADNIK, J. (1985): Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde. - Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.
- HURKA, K. (2005): Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Brouci

Käfer

Gnorimus variabilis

- CONRAD, R. (1994): Zur Verbreitung und Gefährdung ausgewählter Blatthornkäferarten (Coleoptera, Scarabaeidae) Thüringens. - Naturschutzreport **7** (1): S. 247-262.
- FLOßMANN, ST. (2005): Das Vorkommen von *Gnorimus variabilis* (Linnaeus, 1758) in Thüringen (Coleoptera, Scarabaeidae). - Thür. Faun. Abh. **X**: S. 211-214.
- HARTMANN, M., KOPETZ, A. & A. WEIGEL (1999): Wiederfunde verschollener Käferarten seit dem Erscheinen des „Verzeichnisses der Käfer Deutschlands“ (Insecta, Coleoptera). - Thür. Faun. Abh. **VII**: S. 229-245.
- HURKA, K. (2005): Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Brouci Ceske a Slovenske republiky. - Nakladatelstvi Kabourek Zlin.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomofauna Germanica. Ent. Nachr. Ber. (Dresden), Beiheft **4**: S. 1-185.
- KOPETZ, A. & A. WEIGEL (2003): Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2000 bis 2003 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera). - Thür. Faun. Abh. **IX**: S. 149-168.
- LÖBL, I. & A. SMETANA (2006): Catalogue of palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. - Apollo Books, Stenstrup.
- RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. Bd. II. - Selbstverlag, Erfurt.
- RAPP, O. (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie, Nachtrag 1. - Unveröff. Manuskript.
- RÖSSER, E. & U. POLLER (1999): Faunistisch interessante Blatthornkäfer des Naturkundlichen Museums Mauritania Altenburg und Berichtigungen sowie Ergänzungen zur „Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg“ (Col. Scarabaeoidea). - Mauritiana **17** (2): S. 315-324.
- STUMPF, W. (2004) Beobachtungen und Funddaten von Prachtkäfern und seltenen Blatthornkäfern aus dem Jahre 2004 (Coleoptera: Buprestidae, Scarabaeidae). - Mitt. Thür. Entomol. **11** (2): S. 33-35.

Käfer***Meloe coriarius***

- FREUDE, H., HARDE, K. W. & G. A. LOHSE (1969): Die Käfer Mitteleuropas. Band 8 Terebrilia, Heteromera, Lamellicornia. - Goedecke & Evers Verlag, Krefeld.
- HURKA, K. (2005): Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Brouci Ceske a Slovenske republiky. - Nakladatelstvi Kabourek Zlin.
- JÄNICKE, M. (1995): Checkliste der Ölkäfer (Meloidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten, Teil 3: S. 45-46.
- JÄNICKE, M. (1997): Ergänzungen zur Checkliste der Thüringer Ölkäfer (Meloidae). - Check-Listen Thüringer Insekten, Teil 5: S. 44-44.
- JÄNICKE, M. (2001): Rote Liste der Ölkäfer (Coleoptera: Meloidae) Thüringens. - Naturschutzreport 18: S. 158-159.
- KLAUSNITZER, B. (2004): Bemerkungen zur Biologie und Verbreitung einiger Meloidae (Col.) in Mitteleuropa. - Ent. Nachr. Ber. 48 (3/4): S. 261-267.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomofauna Germanica. Ent. Nachr. Ber. (Dresden), Beiheft 4: S. 1-185.
- REITTER, E. (1911): FAUNA GERMANICA. Die Käfer des Deutschen Reiches. III Band. - K. G. Lutz' Verlag, Stuttgart.
- TEV - THÜRINGER ENTOMOLOGEN VERBAND (2007): Datenbank J. Weipert, Stand 30.11.2007.
- ZAHRADNIK, J. (1985): Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde. - Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.

Käfer***Meloe rugosus***

- FREUDE, H., HARDE, K. W. & G. A. LOHSE (1969): Die Käfer Mitteleuropas. Band 8 Terebrilia, Heteromera, Lamellicornia. - Goedecke & Evers Verlag, Krefeld.
- HURKA, K. (2005): Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Brouci Ceske a Slovenske republiky. - Nakladatelstvi Kabourek Zlin.
- JÄNICKE, M. (1995): Checkliste der Ölkäfer (Meloidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten, Teil 3: S. 45-46.
- JÄNICKE, M. (2001): Rote Liste der Ölkäfer (Coleoptera: Meloidae) Thüringens. - Naturschutzreport 18: S. 158-159.
- KLAUSNITZER, B. (2004): Bemerkungen zur Biologie und Verbreitung einiger Meloidae (Col.) in Mitteleuropa. - Ent. Nachr. Ber. 48 (3/4): S. 261-267.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomofauna Germanica. Ent. Nachr. Ber. (Dresden), Beiheft 4: S. 1-185.
- LÜCKMANN, J. & M. KUHLMANN (1997): Die Triungulinen von Meloe brevicollis Panz. und Meloe rugosus Marsh. mit Anmerkungen zur Biologie und Ökologie der Larven (Col., Meloidae). - Ent. Nachr. Ber. 41 (3): S. 183-189.
- REITTER, E. (1911): FAUNA GERMANICA. Die Käfer des Deutschen Reiches. III Band. - K. G. Lutz' Verlag, Stuttgart.
- TEV - THÜRINGER ENTOMOLOGEN VERBAND (2007): Datenbank J. Weipert, Stand 30.11.2007.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2007): LINFOS-Datenbankauszug, Stand 30.11.2007.
- ZAHRADNIK, J. (1985): Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde. - Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.

Käfer***Necydalis major***

- BENSE, U. (1995): Longhorn beetles. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. - Bockkäfer. Illustrierter Schlüssel zu den Cerambyciden und Vesperiden Europas. - Margraf-Verlag, Weikersheim.
- CONRAD, R. (1985): Zum Vorkommen geschützter und seltener Bockkäfer (Cerambycidae) in Thüringen und Maßnahmen zu ihrem Schutz. - Veröff. Museen Gera 11: S. 23-31.
- FLOßMANN, ST. (2005): Das Vorkommen von *Gnorimus variabilis* (Linnaeus, 1758) in

- Thüringen (Coleoptera, Scarabaeidae). - Thür. Faun. Abh. **X**: S. 211-214.
- HERTZEL, G. (1993): Ergänzende Fundmeldungen von in Ostdeutschland seltenen Bockkäfern (Coleoptera, Cerambycidae). - Ent. Nachr. Ber., **37**: S. 130-132.
- HURKA, K. (2005): Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Brouci Ceske a Slovenske republiky. - Nakladatelstvi Kabourek Zlin.
- KLEEBERG, A. (2001): Ein weiterer Nachweis von *Necydalis major* L. (Col. Cerambycidae) in Mecklenburg-Vorpommern an Erle. - Ent. Nachr. Ber., **45**: 127.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomofauna Germanica. Ent. Nachr. Ber. (Dresden), Beiheft **4**: S.1-185.
- MOHR, K.-H. (1963): Die Käferfauna des Kyffhäuser-Südabfalls. - Wiss. Z. Uni Halle Mat-N.R.N.F., **7**(12): S. 513-565.
- NIEHUIS, M. (2001): Die Bockkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. - Schr.-Reihe Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **26**, Landau (GNOR).
- RAPP, O. (1933-1935): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie. Band I-III. - Erfurt.
- RAPP, O. (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. 1. Nachtrag. - unveröff. Mskr., Erfurt.
- TEV (THÜRINGER ENTOMOLOGEN VERBAND) (2007): Datenbank J. Weipert, Stand 30.11.2007.
- TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2007): LINFOS-Datenbankauszug, Stand 30.11.2007.

Käfer

Osmoderma eremita

- BEUTLER, H. & D. BEUTLER (2002): Katalog der natürlichen Lebensräume und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie in Brandenburg. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg, Heft 1,2.
- CONRAD, R. (1994): Zur Verbreitung und Gefährdung ausgewählter Blatthornkäferarten (Coleoptera, Scarabaeidae) Thüringens. - Naturschutzreport **7** (1): S. 47-262.
- GREBENŠČIKO, I. (1982): Die Fauna der Blatthornkäfer (Coleoptera, Lamellicornia) des nördlichen Harzvorlandes. - Hercynia N.F. **19** (1): S. 16-41.
- GRILL, E. (2000): *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763) - Eremit, Juchtenkäfer. - In: ENTOMOLOGEN-VEREINIGUNG SACHSEN-ANHALT e. V. (2000) (Hrsg.): Zur Bestandssituation wirbelloser Arten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. - Ent. Mitt. Sachsen-Anhalt, Sonderheft: S. 22-24.
- HORION, A. (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer (Lamellicornia), VI. - Verlagsdruckerei Schmidt, Überlingen-Bodensee.
- KLAUSNITZER, B. & F.-T. KRELL (1996): Überfamilie Scarabaeoidea. In: KLAUSNITZER, B.: Die Larven der Käfer Mitteleuropas. 3. Band Polyphaga, Teil 2. - Gustav-Fischer-Verlag. Jena-Stuttgart: S. 11-89.
- MÜLLER, T. (2001): Eremit (*Osmoderma eremita*). - In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H. SALM, P. & E. SCHRÖDER: Berichtspflichten in NATURA-2000 Gebieten - Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhang II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie. Angewandte Landschaftsökologie **42**: S. 310-318. Bonn-Bad Godesberg.
- LEHMANN, U. (1990): Zur Größe von *Osmoderma eremita* SCOPOLI (Coleoptera, Scarabaeidae). - Ent. Nachr. Ber. **34** (5): S. 232-232.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa und den österreichischen Alpen. - Arnstadt: S. 1-165.
- LÖBL, I. & A. SMETANA (2006): Catalogue of palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. - Apollo Books, Stenstrup: 690 S.
- PALM, T. (1959): Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opuscula Entomol. Suppl. XVI. Lund.
- RAPP, O. (1933-1935): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der

- faunistisch-oekologischen Geographie. - Erfurt.
- SCHAFFRATH, U. (1994a): Beitrag zur Kenntnis der Blatthorn- und Hirschkäfer (Col.: Trogidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Lucanidae) in Nordhessen. - *Philippia* **7** (1): S. 1-60.
- SCHAFFRATH, U. (1994b): Faunistisches Schutzwürdigkeitsgutachten Südwest-Kyffhäuser. Kassel.
- SCHAFFRATH, U. (2003): *Osmoderma eremita*. - In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHROEDER, E. & A. SSYMANK: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft **69** (1): S. 415-425. Bonn-Bad Godesberg.
- STEGNER, J. (2002): Der Eremit, *Osmoderma eremita* (Scopoli, 1763) (Co., Scarabaeidae), in Sachsen: Anforderungen an Schutzmaßnahmen für eine prioritäre Art der FFH-Richtlinie. - Ent. Nachr. Ber. **46** (4): S. 213-238
- STEGNER, J., STRZELCZYK, P. & T. MARSCHEL (2009): Der Juchtenkäfer (*Osmoderma eremita*) – Schönwölkau; 59 S.
- TIETZE, F. (1996): Gutachten zum Auftreten von *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763), Eremit oder Juchtenkäfer, in der Region Halle und in Deutschland. - OEKOKART GmbH Halle/S. Büro für Landschaftsplanung & Angewandte Ökosystemstudien, Unveröff. Gutachten, Halle/S.
- WEIGEL (1995): Erfassung xylobionter Käferarten aus den Familien Blatthornkäfer und Bockkäfer (Coleoptera: Scarabaeidae pt., Cerambycidae) in ausgewählten Gebieten Ostthüringens sowie Überprüfung von historischen Eremitfunden (Coleoptera: Scarabaeidae, *Osmoderma eremita*) im Brahmatal bei Gera-Roschütz. – Unveröff. Gutachten. i.A. Staatl. Umweltamt Gera.
- WEIGEL, A. (1996): Zur Bestandssituation des Eremit (*Osmoderma eremita* L.) in Nordostthüringen im mittleren Elstertal nördlich von Gera und im Gebiet um Bürgel-Hermsdorf-Eisenberg aus historischer und aktueller Sicht (Thüringen). – Unveröff. Gutachten i.A. Staatl. Umweltamt Gera.
- WEIGEL, A. (2000): Zur Holzkäferfauna des Brahmets zwischen Röpsen und Zschippach unter besonderer Berücksichtigung des Eremit-Vorkommens (*Osmoderma eremita* L.) (THÜRINGEN: Stadt Gera, Landkreis Greiz). - Unveröff. Gutachten i.A. Staatl. Umweltamt Gera.
- WEIPERT, J. & A. WEIGEL (2002): Historische und aktuelle Verbreitung von Hirschkäfer, *Lucanus cervus* (LINNAEUS, 1758) und Eremit, *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutachten i.A. Thür. Landesanst. für Umwelt und Geologie Jena.
- ZAHRADNIK, J. (1985): Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde. - Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.

Käfer

Protaetia aeruginosa

- CONRAD, R. (1994): Zur Verbreitung und Gefährdung ausgewählter Blatthornkäferarten (Coleoptera, Scarabaeidae) Thüringens. - Naturschutzreport **7** (1): S. 247-262.
- FLOßMANN, ST. (2005): Das Vorkommen von *Gnorimus variabilis* (Linnaeus, 1758) in Thüringen (Coleoptera, Scarabaeidae). - Thür. Faun. Abh. **X**: S. 211-214.
- HURKA, K. (2005): Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Brouci Ceske a Slovenske republiky. - Nakladatelstvi Kabourek Zlin.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomofauna Germanica. Ent. Nachr. Ber. (Dresden), Beiheft **4**: S.1-185.
- LÖBL, I. & A. SMETANA (2006): Catalogue of palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. - Apollo Books, Stenstrup, 2006.
- RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. Bd. II. - Selbstverlag, Erfurt.

- RÖSSER, E. & U. POLLER (1999): Faunistisch interessante Blatthornkäfer des Naturkundlichen Museums Mauritianum Altenburg und Berichtigungen sowie Ergänzungen zur „Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg“ (Col. Scarabaeidea). - *Mauritiana* **17** (2): S. 315-324.
- SCHWARTZ, A. (1982): Zum gegenwärtigen Vorkommen von *Protaetia* (*Centonischema*) *aeruginosa* (DRURY) in der DDR (Insecta, Coleoptera, Cetoniinae). - *Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden*, **9** (7): S. 101-107.
- SCHWARTZ, A. (1989): Faunistik, Biologie und Schutzmöglichkeiten von *Potosia aeruginosa* (DRURY) in der DDR. - *Verhandl. XI. SIEEC Gotha (Dresden)*: 257-258.
- TEV - THÜRINGER ENTOMOLOGEN VERBAND (2007): Datenbank J. Weipert, Stand 30.11.2007.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2007): LINFOS-Datenbankauszug, Stand 30.11.2007.
- Aktualisierung: 30.03.2010