

Käfer

Lucanus cervus

- BRECHTEL, F. & H. KOSTENBADER (2002): Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- CONRAD, R. (1992): Zur Verbreitung und Gefährdung der Hirschkäferarten (Coleoptera, Lucanidae) Thüringens. - Naturschutzreport, **4**: S. 123-132.
- CONRAD, R. (1995): Checklist der Hirschkäfer (Coleoptera: Lucanidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten, Teil **3**: S. 53-53.
- HORION, A. (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer (Lamellicornia), **VI**, Überlingen.
- KLAUSNITZER, B. (1982): Die Hirschkäfer. - Die Neue Brehm Bücherei Nr. 551. A. Ziemsen Verlag, Lutherstadt Wittenberg.
- KLAUSNITZER, B. & F.-T. KRELL (1996): Überfamilie Scarabaeoidea. In: KLAUSNITZER, B. (1996): Die Larven der Käfer Mitteleuropas. 3. Band Polyphaga, Teil 2. - Gustav-Fischer-Verlag. Jena-Stuttgart: S. 11-89.
- KLAUSNITZER, B. & C. WURST (2003): *Lucanus cervus* (LINNAEUS, 1758). - In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHROEDER, E. & A. SSYMANK: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft **69** (1): S. 403-414. Bonn-Bad Godesberg.
- KÜHNEL, H. & V. NEUMANN (1981): Die Lebensweise des Hirschkäfers (*Lucanus cervus* L.). - Naturschutzarbeit Halle - Magdeburg **18**: S. 7-14.
- JÄNICKE, M. (1985): Zum Vorkommen von Hirschkäfer (*Lucanus cervus*), Spanischer Flagge (*Callimorpha quadripunctaria*) Blauflügel-Prachtlibelle und Gebänderter Prachtlibelle (*Calopteryx virgo*, *C. splendens*) im Bezirk Gera. - Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R. 11: S. 19-22.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa und den österreichischen Alpen. - Arnstadt: S. 1-165.
- LINFOS (2009): Datenbankauszug der TLUG Jena, Stand 28.10.2009.
- MOHR, K.-H. (1963): Die Käferfauna des Kyffhäuser-Südabfalls. - Wiss. Z. Uni Halle Mat-N.R.N.F., **7** (12): S. 513-565.
- MÜLLER, T. (2001): Hirschkäfer (*Lucanus cervus*) - In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H., SALM, P. und E. SCHRÖDER: Berichtspflichten in NATURA-2000 Gebieten - Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhang II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie. Angewandte Landschaftsökologie **42**: S. 306-310. Bonn-Bad Godesberg.
- PALM, T. (1959): Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. - Opuscula Entomol. Suppl. XVI. Lund.
- RAPP, O. (1933-1935): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. - Erfurt.
- RÖSSNER, E. (1999): Aktuelle Nachweise neuer, verschollener oder gefährdeter Arten der Blatthornkäfer und Hirschkäfer (Col.: Scarabaeoidea) in Thüringen. - Thür. Faun. Abh. **VI**: S. 191-200.
- SCHAFFRATH, U. (1996) Untersuchung der Hirsch- und Blatthornkäfer, Laufkäfer (Lamellicornia, Carabidae) in ausgewählten Gebietsteilen des Ilmkreises. - Unveröff. Gutachten im Auftrag des Staatlichen Umweltamtes Erfurt. S. 1-62.
- SCHNITTER, P., EICHEN, C., ELLWANGER, G. & M. NEUKIRCHEN (2006): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle). Sonderheft 2.
- STUMPF, W. (1997): Nachweise von *Lucanus cervus* L. (Coleoptera, Lucanidae) in Thüringen. - Mitt. Thür. Entomologenverein **4** (2): S. 82.
- TEV - THÜRINGER ENTOMOLOGEN VERBAND (2009): Datenbank J. Weipert, Stand 02.11.2009.
- WEIGEL, A. (1994): Die holzbewohnenden Käfer (Coleoptera xylobionta) im NSG "Schenkenberg" bei Bad Blankenburg

unter besonderer Berücksichtigung des Hirschkäfervorkommens (*Lucanus cervus* L., 1758). - Unveröff. Gutachten. Thür. Landesanst. für Umwelt Jena.

WEIPERT, J. & A. WEIGEL (2002): Historische und aktuelle Verbreitung von Hirschkäfer, *Lucanus cervus* (LINNAEUS, 1758) und

Eremit, *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutachten i.A. Thür. Landesanst. für Umwelt und Geologie Jena.

Käfer

Osmoderma eremita

- BEUTLER, H. & D. BEUTLER (2002): Katalog der natürlichen Lebensräume und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie in Brandenburg. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg, Heft 1,2.
- CONRAD, R. (1994): Zur Verbreitung und Gefährdung ausgewählter Blatthornkäferarten (Coleoptera, Scarabaeidae) Thüringens. - Naturschutzreport 7 (1): S. 47-262.
- GREBENŠČIKO, I. (1982): Die Fauna der Blatthornkäfer (Coleoptera, Lamellicornia) des nördlichen Harzvorlandes. - Hercynia N.F. 19 (1): S. 16-41.
- GRILL, E. (2000): *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763) - Eremit, Juchtenkäfer. - In: ENTOMOLOGEN-VEREINIGUNG SACHSEN-ANHALT e. V. (2000) (Hrsg.): Zur Bestandssituation wirbelloser Arten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. - Ent. Mitt. Sachsen-Anhalt, Sonderheft: S. 22-24.
- HORION, A. (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer (Lamellicornia), VI. - Verlagsdruckerei Schmidt, Überlingen-Bodensee.
- KLAUSNITZER, B. & F.-T. KRELL (1996): Überfamilie Scarabaeoidea. In: KLAUSNITZER, B.: Die Larven der Käfer Mitteleuropas. 3. Band Polyphaga, Teil 2. - Gustav-Fischer-Verlag. Jena-Stuttgart: S. 11-89.
- MÜLLER, T. (2001): Eremit (*Osmoderma eremita*). - In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H. SALM, P. & E. SCHRÖDER: Berichtspflichten in NATURA-2000 Gebieten - Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhang II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie. Angewandte Landschaftsökologie 42: S. 310-318. Bonn-Bad Godesberg.
- LEHMANN, U. (1990): Zur Größe von *Osmoderma eremita* SCOPOLI (Coleoptera, Scarabaeidae). - Ent. Nachr. Ber. 34 (5): S. 232-232.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa und den österreichischen Alpen. - Arnstadt: S. 1-165.
- LÖBL, I. & A. SMETANA (2006): Catalogue of palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. - Apollo Books, Stenstrup: 690 S.
- PALM, T. (1959): Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opuscula Entomol. Suppl. XVI. Lund.
- RAPP, O. (1933-1935): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. - Erfurt.
- SCHAFFRATH, U. (1994a): Beitrag zur Kenntnis der Blatthorn- und Hirschkäfer (Col.: Trogidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Lucanidae) in Nordhessen. - Philippia 7 (1): S. 1-60.
- SCHAFFRATH, U. (1994b): Faunistisches Schutzwürdigkeitsgutachten Südwest-Kyffhäuser. Kassel.
- SCHAFFRATH, U. (2003): *Osmoderma eremita*. - In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHROEDER, E. & A. SSYMANCK: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69 (1): S. 415-425. Bonn-Bad Godesberg.
- STEGNER, J. (2002): Der Eremit, *Osmoderma eremita* (Scopoli, 1763) (Co., Scarabaeidae), in Sachsen: Anforderungen an Schutzmaßnahmen für eine prioritäre Art der FFH-Richtlinie. - Ent. Nachr. Ber. 46 (4): S. 213-238

- STEGNER, J., STRZELCZYK, P. & T. MARSCHEL (2009): Der Juchtenkäfer (*Osmoderma eremita*) – Schönwölkau; 59 S.
- TIETZE, F. (1996): Gutachten zum Auftreten von *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763), Eremit oder Juchtenkäfer, in der Region Halle und in Deutschland. - OEKOKART GmbH Halle/S. Büro für Landschaftsplanung & Angewandte Ökosystemstudien, Unveröff. Gutachten, Halle/S.
- WEIGEL (1995): Erfassung xylobionter Käferarten aus den Familien Blatthornkäfer und Bockkäfer (Coleoptera: Scarabaeidae pt., Cerambycidae) in ausgewählten Gebieten Ostthüringens sowie Überprüfung von historischen Eremitfunden (Coleoptera: Scarabaeidae, *Osmoderma eremita*) im Brahmatal bei Gera-Roschütz. – Unveröff. Gutachten. i.A. Staatl. Umweltamt Gera.
- WEIGEL, A. (1996): Zur Bestandssituation des Eremit (*Osmoderma eremita* L.) in Nordostthüringen im mittleren Elstertal nördlich von Gera und im Gebiet um Bürgel-Hermsdorf-Eisenberg aus historischer und aktueller Sicht (Thüringen). – Unveröff. Gutachten i.A. Staatl.Umweltamt Gera.
- WEIGEL, A. (2000): Zur Holzkäferfauna des Brahmets zwischen Röpsen und Zschippach unter besonderer Berücksichtigung des Eremit-Vorkommens (*Osmoderma eremita* L.) (THÜRINGEN: Stadt Gera, Landkreis Greiz). - Unveröff. Gutachten i.A. Staatl. Umweltamt Gera.
- WEIPERT, J. & A. WEIGEL (2002): Historische und aktuelle Verbreitung von Hirschkäfer, *Lucanus cervus* (LINNAEUS, 1758) und Eremit, *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutachten i.A. Thür. Landesanst. für Umwelt und Geologie Jena.
- ZAHRADNIK, J. (1985): Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde. - Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.